

## Caso Estomatológico

*José M. S. Amorim<sup>1</sup>*

Criança de 11 anos de idade que foi enviada à consulta de Estomatologia devido a neoformação a nível do dorso da língua, de crescimento lento, indolor, sem hemorragia espontânea, ocorrendo esta por traumatismo ocasional nos dentes ou com os alimentos.

Ao exame objectivo a criança apresenta bom desenvolvimento estado-ponderal.

Ao nível oral apresenta boa higiene oral, não sendo visíveis cáries dentárias. Apresenta tumefacção no dorso da língua à esquerda, de contornos bem definidos, de consistência mole, revestida por mucosa normal e de cor amarelada (Figura 1).

Antecedentes pessoais e familiares irrelevantes.

Face ao descrito:

**Qual o seu diagnóstico?**

**Qual a sua atitude?**



**Figura 1**

<sup>1</sup> Serviço de Estomatologia Hospital Maria Pia / CH Porto

No caso exposto o diagnóstico a colocar é o de **Papiloma da língua**.

As lesões vegetantes da cavidade oral englobam o papiloma, a verruga vulgar e o carcinoma verrugoso. São caracterizadas por apresentarem um crescimento exofítico, lento e podem surgir em qualquer área da mucosa oral, independentemente desta ser ou não queratinizada.

O papiloma é a lesão tumoral benigna mais frequente, não apresentando predisposição por género e os locais de aparecimento mais frequente são a língua e o palato. Histopatologicamente, esta lesão tem um crescimento exofítico pedunculado, com núcleos de tecido conjuntivo fibroso revestidos por projecções epiteliais papilares. O epitélio apresenta paraqueratose e hiperqueratose. A papilomatose e a acantose também se observam e sugerem possível infecção por vírus do papiloma (HPV), embora só algumas destas lesões apresentem antígenos do vírus. Os HPV são vírus

que podem induzir lesões hiperplásicas, papilomatosas e verrugosas no epitélio escamoso estratificado da pele e das mucosas.

Outra lesão verrugosa benigna muito frequente na pele e raramente na boca é a verruga vulgar, estando esta directamente relacionada ao HPV. A infecção ocorre por auto-inoculação ou por contágio directo sendo os lábios a região mais afectada. A verruga e o papiloma podem ser indistinguíveis do ponto de vista clínico e apresentam muitas semelhanças histológicas.

O carcinoma verrugoso é uma neoplasia maligna da cavidade oral que surge pela 5ª década de vida e tem como factores de risco o consumo de tabaco e a infecção por HPV, apresentando também crescimento exofítico.

Neste caso foi realizada biópsia excisional da lesão com margem de segurança e realizada a sutura com fio reabsorvível. O pós-operatório decorreu sem intercorrências. O estudo histológico

revelou que a exérese da lesão tinha sido completa e que se tratava de um papiloma escamoso.

## ABSTRACT

An 11 year-old boy was referred to our department due to a slow growing and painless neof ormation of the dorsum of the tongue. Excisional biopsy was performed, and the histology revealed a squamous papiloma.

**Keywords:** papiloma, warty carcinoma, HPV

---

Nascer e Crescer 2010; 19(2): 129-30

## BIBLIOGRAFIA

Regezi JA, Sciubba JJ. Tumores odontogénicos. In: Patologia bucal: correlação clínica patológica. 3ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan; 2000. 292-308.